

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren						
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-14	15-17	ab 18	ab 60	
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e			
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e			
Portussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	A (ggf. N) ^e			
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N						
Poliomyelitis		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N	A1	ggr. N				
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N						
Pneumokokken ^a		G1		G2	G3	N	S ^g						
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningokokken C						G1 (ab 12 Monaten)		N					
Masern						G1	G2	S ^f					
Mumps, Röteln						G1	G2	N					
Varizellen						G1	G2	N					
Influenza													S (jährlich)
HPV Humane Papillomviren								G1 ^d	G2 ^d	N ^d			

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- A Auffrischimpfung
- S Standardimpfung
- N Nachholimpfung
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Dosen
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff
- g Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff

Einzelimpfstoffe ab dem Säuglingsalter für die Grundimmunisierung:

Impfstoff	Tetanus	Diphtherie	Polio	Keuchhusten	Hib	Hepatitis B	Pneumokokken	Meningokokken	Rota Viren
Tetanol pur	40 I.E.								
IPV Mérieux			x						
ActHib					x				
HBVax Pro						x			
Prevenar 13							x		
Meningitec u.a.								x	
Rota Teq									x

Kombinationsimpfstoffe ab dem Säuglingsalter für die Grundimmunisierung:

Infanrix	40 I.E.	30 I.E.		25 µg			bis 6 J.
Infanrix-IPV+Hib	40 I.E.	30 I.E.	x	25 µg	x		bis 3 J.
Pentavac							bis 6 J.
Infanrix Hexa	40 I.E.	30 I.E.	x	25 µg	x	x	bis 3 J.

Kombinationsimpfstoffe mit Zulassung

- für Auffrischimpfungen nach der Grundimmunisierung:

- und für Erstimpfungen:

Td-rix, (ab 6 J.)	20 I.E.	2 I.E.					ab 6 Jahre
Revaxis (ab 5 J.)	20 I.E.	2 I.E.	x				ab 5 Jahre
Tdap Immun (4 J)	20 I.E.	2 I.E.		20,0 µg			ab 4 Jahre
Covaxis (ab 4 J.)	20 I.E.	2 I.E.		2,5 µg			ab 12 Jahre
Boostrix (ab 4 J.)	20 I.E.	2 I.E.	(x)	2,5 µg			ab 40 Jahre
Repevax (ab 3 J.)	20 I.E.	2 I.E.	x	2,5 µg			ab 12 Jahre